

GEBRAUCHSANWEISUNG



LIPPENHERPES-GEL

Medizinprodukt mit rein mineralischem Silicium-Gel

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Medizinproduktes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

ANWENDUNGSGEBIETE

Wann wird sikapur® med Lippenherpes Gel angewandt?

sikapur® med Lippenherpes Gel wird äußerlich angewandt

- zur Linderung von Brennen und Juckreiz bei Lippenherpes (Herpes labialis)
- trocknet Herpesbläschen aus

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Wann, wie oft und wie lange sollten Sie sikapur® med Lippenherpes Gel anwenden?

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: Je nach Bedarf bereits ab den ersten Anzeichen bis zu 5-mal täglich sikapur® med Lippenherpes Gel auf die betroffenen Hautbereiche auf tupfen, bis die Bläschen vollständig abgeheilt sind.

Wie sollten Sie sikapur® med Lippenherpes Gel anwenden?

Tragen Sie sikapur® med Lippenherpes Gel bis zu 5-mal täglich mit einem Wattestäbchen oder mit der gereinigten Fingerspitze auf die betroffenen Hautbereiche auf tupfen.

BITTE BEACHTEN



Bei erfolgloser Behandlung spätestens nach 10 Tagen ein Arzt aufsuchen. Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Während der langjährigen Anwendung dieses Medizinproduktes sind keine schädigenden Wirkungen bekannt geworden. Das Produkt soll aber in der Schwangerschaft und Stillzeit erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit sikapur® med Lippenherpes Gel aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse an den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Das Lippenherpes-Gel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

HINWEIS ZUR ANWENDUNG



Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von weiteren Infektionen sollten vor und nach dem Auftragen die Hände gründlich gereinigt werden. Um eine Übertragung der Infektion auf

andere Personen zu vermeiden, sollte die Tube nur von einer Person benutzt werden. Nach der Anwendung empfiehlt es sich, die Tubenöffnung abzuwischen. Drehen Sie bitte nach der Anwendung den Verschlussdeckel auf die Tube.

Nach dem Trocknen des Gels auf der Haut kann sich eine weiße Oberfläche bilden. Dies ist ein Zeichen für das Austrocknen der Herpes-Bläschen.

NEBENWIRKUNGEN

Das Medizinprodukt enthält Kaliumsorbat. Kaliumsorbat kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Es sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt.

WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN MITTELN

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.



GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie sikapur® med Lippenherpes Gel nicht anwenden?

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt. Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile bitte das Produkt nicht anwenden.

HINWEISE UND ANGABEN ZUR

HALTBARKEIT DES MEDIZINPRODUKTES



sikapur® med Lippenherpes Gel darf nur bis zu dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verwendbarkeitsdatum angewendet werden. Nach Anbruch sollten Sie sikapur® med Lippenherpes Gel nicht länger als 6 Monate anwenden. Bewahren Sie sikapur® med Lippenherpes Gel bitte nicht über 25 °C auf.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Tube mit 2 g Gel zur äußerlichen Anwendung.

ZUSAMMENSETZUNG

Was ist in sikapur® med Lippenherpes Gel enthalten?

Wirksamer Bestandteil: 2 g sikapur® med Lippenherpes Gel enthalten 1,9 g Kieselsäure-Gel (Silicium-Gel). Sonstige Bestandteile: Pentylen glycol, Carrageen, α -Bisabolol, Kaliumsorbat, Citronensäurelösung.

STAND DER INFORMATION

März 2020

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND



hübner

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG
Schlossstrasse 11-17, 79238 Ehrenkirchen, Germany
www.huebner-vital.de

VERTRIEB IN ÖSTERREICH

Dermapharm GmbH, AT-1010 Wien

MEDICAL DEVICE

MD C € 0297



G102576-04
Code 4822

WISSENSWERTES ZU LIPPENHERPES


Die Infektion mit dem Herpes-Virus ist eine der häufigsten Viruserkrankungen des Menschen: ca. 90% der Bevölkerung tragen den Virus in sich. Bei ca. 20% der Infizierten kommt Lippenherpes tatsächlich zum Ausbruch.

Durch verschiedene Auslöser, wie z. B. Fieber, starke UV-Strahlung oder Stress, können die Herpeserreger immer wieder aktiviert werden. Aber auch die Übertragung durch andere Personen kann Herpes auslösen. Kribbeln, Brennen und Jucken sind oft die ersten Anzeichen von Lippenherpes vor der Bildung von Herpes-Bläschen. Diese nässenden Bläschen jucken und sind hoch infektiös. Wichtig bei der Behandlung ist die gezielte Austrocknung der Bläschen und somit die Vermeidung der Ausbreitung des infektiösen Sekrets.


SIKAPUR® MED LIPPENHERPES-GEL

Das Silicium-Gel unterstützt hier eine gezielte Austrocknung der Bläschen. Denn die außergewöhnlich große Bindungsfähigkeit des rein mineralischen Silicium-Gels sichert bei bereits gebildeten Herpes-Bläschen ein gezieltes Austrocknen. sikapur® med Lippenherpes-Gel sollte schon beim ersten Kribbeln angewendet werden.


Der wirksame Bestandteil des Lippenherpes-Gel ist Silicium-Gel, eine Verbindung des Mineralstoffes Silicium mit Sauerstoff und Wasser.



Herpesbläschen



sikapur® med Lippenherpes-Gel bindet infektiöses Sekret



Austrocknung des Bläschens

Das Besondere an Silicium-Gel ist neben der Linderung von Brennen und Juckreiz seine außergewöhnlich große Bindungsfähigkeit für Sekrete. So wird auf natürliche Weise das infektiöse Sekret der Herpes-Bläschen gebunden – die Bläschen werden gezielt ausgetrocknet. Dadurch wird die Ausbreitung des Virus eingeschränkt.

TIPPS ZU VORBEUGUNG UND SCHUTZ

- Eine gesunde Lebensweise mit abwechslungsreicher Kost, Sport und ausreichend Schlaf stärkt das körpereigene Abwehrsystem.
- Bei starker Sonneneinstrahlung einen Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden.
- Lippenherpes kann auf andere Körperteile übertragen werden und ist insbesondere auch ansteckend für andere Personen.

Deshalb:

- Nicht an den Bläschen kratzen.
- Alles, was mit den Lippen in Berührung kommen kann, nicht mit anderen teilen (z. B. Tasse, Handtücher, etc.).
- Nicht küssen oder schmusen.

- ✓ Lindert Brennen und Juckreiz bei Lippenherpes
- ✓ Trocknet Herpesbläschen aus



*Zschocke, I., et. al. (2007) „silica gel is as effective as acyclovir cream in patients with recurrent herpes labialis: results of a randomized, open-label trial.“ J Dermatolog Treat 19(3): 176-181.